

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

がん疼痛治療用即放性分包内服液
オキシコドン塩酸塩水和物内用液

オキシコドン内服液 2.5mg「日本臓器」
オキシコドン内服液 5 mg「日本臓器」
オキシコドン内服液 10 mg「日本臓器」
オキシコドン内服液 20 mg「日本臓器」

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび上記製品の「使用上の注意」の記載内容の一部を改訂しましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

(下線 部：改訂箇所)

改訂前				改訂後			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
種類\頻度	5%以上	5%未満	頻度不明	種類\頻度	5%以上	5%未満	頻度不明
循環器	(略)	(略)	(略)	循環器	(略)	(略)	(略)
精神神経系	眠気 (16.9%)、 傾眠、眩暈	頭痛・頭重 感、不眠	発汗、幻覚、意識障害、 しびれ、筋れん縮、焦 燥、不安、異夢、悪夢、 興奮、視調節障害、縮 瞳、神経過敏、感覚異 常、痙攣、振戦、筋緊張 亢進、健忘、抑うつ、感 情不安定、多幸感、思 考異常、構語障害	精神神経系	眠気 (16.9%)、 傾眠、眩暈	頭痛・頭重 感、不眠	発汗、幻覚、意識障害、 しびれ、筋れん縮、焦 燥、不安、異夢、悪夢、 興奮、視調節障害、縮 瞳、神経過敏、感覚異 常、痙攣、振戦、筋緊張 亢進、健忘、抑うつ、感 情不安定、多幸感、思 考異常、構語障害、 <u>痛 覚過敏^{注)}、アロディニ ン</u>
消化器	(略)	(略)	(略)	消化器	(略)	(略)	(略)

注) 増量により痛みが増悪する。

【改訂理由】

先発品の自主改訂に伴い、「11.2 その他の副作用」の項を改訂しました。

今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.326 に掲載予定です。

なお、改訂後の電子添文は、
PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）
に掲載されています。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を利用し、下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンや
タブレット端末でご覧いただくことも可能です。

●GS1 バーコード

オキシコドン内服液 2.5mg オキシコドン内服液 5mg オキシコドン内服液 10mg オキシコドン内服液 20mg



(01)04987174437008



(01)04987174438005



(01)04987174439002



(01)04987174440008

【お問い合わせ先】 日本臓器製薬株式会社 くすりの相談窓口（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

フリーダイヤル：0120-630-093 TEL：06-6233-6085

FAX：06-6233-6087 電子メール：okusuri@nippon-zoki.co.jp