

製造販売元：日本臓器製薬株式会社

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

使用上の注意等改訂のお知らせ

慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤

1日2回投与型トラマドール塩酸塩徐放錠

ツートラム[®]錠 25 mg
ツートラム[®]錠 50 mg
ツートラム[®]錠 100mg
ツートラム[®]錠 150mg

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび上記製品の「使用上の注意」等の記載内容の一部を改訂しましたのでお知らせいたします。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂箇所】

(下線部：改訂箇所)

改訂前			改訂後		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リネゾリド	(略)	(略)	リネゾリド	(略)	(略)
アルコール	(略)	(略)	<u>メチルチオニニウム塩化物水和物（メチレンブルー）</u>	<u>セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）があらわれるおそれがある。</u>	<u>メチルチオニニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が増強される。</u>
			アルコール	(略)	(略)

【改訂理由】

（自主改訂）

メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」の「併用注意」の項にオピオイド系薬剤が追記されたことに伴い、製剤間の整合性を図るため、メチルチオニニウム塩化物水和物（メチレンブルー）を追加しました。

今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.327に掲載予定です。

なお、改訂後の電子添文は、

PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
及び弊社ホームページ(https://www.nippon-zoki.co.jp/medical/products.html#title_ta)に掲載されています。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を利用し、下記GS1バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただくことも可能です。

●GS1バーコード

ツートラム錠 25mg	ツートラム錠 50mg	ツートラム錠 100mg	ツートラム錠 150mg
 (01)04987174186005	 (01)04987174189006	 (01)04987174187002	 (01)04987174188009

【お問い合わせ先】日本臓器製薬株式会社 くすりの相談窓口（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

フリーダイヤル：0120-630-093 TEL：06-6233-6085

FAX：06-6233-6087 電子メール：okusuri@nippon-zoki.co.jp