

2024 年 6-7 月

日 医 工 株 式 会 社
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

「使用上の注意」改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

高脂血症治療剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 シンバスタチン錠

シンバスタチン錠 5mg 「EMEC」

シンバスタチン錠 10mg 「EMEC」

シンバスタチン錠 20mg 「EMEC」

製造販売元 アルフレッサ ファーマ株式会社

発売元 エルメッド株式会社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ ：自主改訂による削除箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用			10. 相互作用		
省略（変更なし）			省略		
10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略（変更なし）			省略		
アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビススタットを含有する 製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	これらの薬剤は CYP3A4 を阻害 し、本剤の代謝 が抑制される。	アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビススタットを含有する 製剤： <u>スタリビルド</u> ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	これらの薬剤は CYP3A4 を阻害 し、本剤の代謝 が抑制される。

<改訂理由>

- ・すでに販売中止・経過措置期間満了となっているエルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフルマル酸塩（販売名：スタリビルド）を、10.1 併用禁忌から削除しました。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

シンバスタチン錠「EMEC」



(01)14987376907108

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.327」(2024 年 7 月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載致します。