

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2024年6月
大原薬品工業株式会社
安全管理部

HMG-CoA還元酵素阻害剤
—高脂血症治療剤—
日本薬局方 シンバスタチン錠

シンバスタチン錠5mg「オハラ」
シンバスタチン錠10mg「オハラ」
シンバスタチン錠20mg「オハラ」
SIMVASTATIN TABLETS 5mg, 10mg, 20mg「OHARA」

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、標記製品の、使用上の注意を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（改訂項目のみ抜粋）

〔—部：削除箇所（自主改訂）〕

改訂後			改訂前		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
＜略：現行どおり＞			＜略＞		
アタザナビル： レイアタツ サキナビルメシル 酸塩： インビラーゼ コビシタットを 含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症 を含むミオパ チー等の重篤 な副作用が起 きるおそれがある。	これらの薬剤 は CYP3A4 を 阻害し、本剤の 代謝が抑制さ れる。	アタザナビル： レイアタツ サキナビルメシル 酸塩： インビラーゼ コビシタットを 含有する製剤： スタリビルド ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症 を含むミオパ チー等の重篤 な副作用が起 きるおそれがある。	これらの薬剤 は CYP3A4 を 阻害し、本剤の 代謝が抑制さ れる。
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
＜略：現行どおり＞			＜略＞		

2. 改訂理由

先発製剤の改訂に伴い、本剤においても同様の改訂をいたしました。
なお、スタリビルド配合錠は既に販売中止されております。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行「DSU 医薬品安全対策情報 No.327」に掲載されます。

最新の電子化された添付文書は、以下のホームページに掲載しております。

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp>)
- 弊社ホームページ (<https://www.ohara-ch.co.jp>)

また、以下のGS1コードを、専用アプリ「添文ナビ[®]」で読み取ることも、ご覧いただくことが可能です。

シンバスタチン錠 5mg・10mg・20mg 「オーハラ」 の GS1 コード



 製造販売元 **大原薬品工業株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野 121-15

【お問い合わせ先】
大原薬品工業株式会社 お客様相談室
〒104-6591 東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー36 階
TEL 0120-419-363 FAX 03-6740-7702

OS2406a