

注意事項等情報改訂のお知らせ

武田テバファーマ株式会社
名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

日本薬局方

シンバスタチン錠

HMG-CoA還元酵素阻害剤

－高脂血症治療剤－

シンバスタチン錠 5mg「武田テバ」
シンバスタチン錠 10mg「武田テバ」
シンバスタチン錠 20mg「武田テバ」

この度、標記製品の「注意事項等情報」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書（以下、電子添文）をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（抜粋）

（削除箇所 下線：_____）

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸 塩： インビラーゼ コビススタットを含む 有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	これらの薬剤は CYP3A4 を 阻 害 し、本剤の代謝 が抑制される。	アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸 塩： インビラーゼ コビススタットを含む 有する製剤： <u>スタリビルド</u> ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	これらの薬剤は CYP3A4 を 阻 害 し、本剤の代謝 が抑制される。

2. 改訂理由

「相互作用：併用禁忌」の項の「スタリビルド」を削除（自主改訂）

コビススタット含有製剤（スタリビルド配合錠）は国内で販売中止となったため削除しました。

- 武田テバDIセンター 0120-923-093 受付時間 9:00～17:30（土日祝日・弊社休業日を除く）
- 医療関係者向けホームページ <https://www.med.takeda-teva.com>

本改訂につきましては、医薬品安全対策情報（Drug Safety Update）No. 327（2024 年 6 月発行）に掲載される
予定です。

最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）に掲載されます。また、
専用アプリ「添文ナビ」より GS1 バーコードを読み取る事で、最新の電子添文等をご参照いただけます。



（シンバスタチン錠「武田テバ」） (01)14987123415979