

## 使用上の注意改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

高脂血症治療剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

日本薬局方 シンバスタチン錠

シンバスタチン錠5mg「杏林」

シンバスタチン錠10mg「杏林」

SIMVASTATIN Tablets

2024年6月

製造販売元

キョーリンリメディオ株式会社

富山県南砺市井波885番地

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、弊社製造販売のシンバスタチン錠5mg「杏林」/シンバスタチン錠10mg「杏林」の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

### 1. 改訂内容（下線部 削除箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
—省略—		これらの薬剤は	—省略—		これらの薬剤は
アタザナビル： レイアタツ サキナビルメシル酸 塩： インビラーゼ コビシタットを含む 有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	CYP3A4 を阻害し、本 剤の代謝が抑制され る。	アタザナビル： レイアタツ サキナビルメシル酸 塩： インビラーゼ コビシタットを含む 有する製剤： スタリビルド ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	CYP3A4 を阻害し、本 剤の代謝が抑制され る。

### 2. 改訂理由

相互作用相手薬の販売中止に基づき、「併用禁忌」の項の「スタリビルド」を削除いたしました。

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>



弊社 医療関係者向け Web サイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>



- 「添文ナビ<sup>®</sup>」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。

シンバスタチン錠5mg・10mg「杏林」



(01)14987060307313



医療関係者向けWebサイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>

本件に関する  
お問い合わせ

キョーリンリメディオ株式会社 学術部

TEL 0120-960189

FAX 0120-189099