

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

用法及び用量の一部変更のお知らせ

劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

2024年6月

免疫抑制剤

日本薬局方 タクロリムスカプセル

タクロリムス カプセル 0.5mg「サンド」

タクロリムス カプセル 1mg「サンド」

タクロリムス カプセル 5mg「サンド」

ニフロファーマ株式会社

大阪府摂津市千里丘新町3番26号

サンド株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1

このたび、標記製品の「用法及び用量」の変更が2024年6月19日付にて、承認されましたので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容（下線部_____：削除箇所）】

改 訂 後	改 訂 前
<p>6. 用法及び用量 〈腎移植の場合〉 通常、初期にはタクロリムスとして1回0.15mg/kgを1日2回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は1回0.06mg/kg、1日2回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。 省略</p>	<p>6. 用法及び用量 〈腎移植の場合〉 通常、移植2日前よりタクロリムスとして1回0.15mg/kgを1日2回経口投与する。術後初期にはタクロリムスとして1回0.15mg/kgを1日2回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は1回0.06mg/kg、1日2回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。 省略</p>

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No.328」に掲載されます。

改訂電子添文につきましては医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) 及び弊社ホームページ「医療関係者向け情報」(<https://www.sandoz.jp/products>) に掲載されます。

【資料請求先】

サンド株式会社 カスタマーケアグループ

TEL 0120-982-001 FAX 03-6257-3633

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日、祝日及び当社休日を除く)