

## 用法及び用量 改訂のお知らせ

## 免疫抑制剤

劇薬、処方箋医薬品(注意－医師等の処方箋により使用すること)

タクロリムス錠 0.5mg・1mg・1.5mg  
2mg・3mg・5mg「あゆみ」

Tacrolimus tablets

タクロリムス錠

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、タクロリムス錠「あゆみ」の用法及び用量一部変更承認に伴い、添付文書を改訂いたしましたのでお知らせいたします。

今後のご使用に際しましては、電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

謹白

記

## ■対象製品

タクロリムス錠 0.5mg・1mg・1.5mg・2mg・3mg・5mg「あゆみ」

## ■改訂内容

「用法及び用量」の項の「腎移植」について、「移植 2 日前」の投与方法が変更されました。

改訂後	改訂前（点線部削除）
<p><b>6. 用法及び用量</b> 〈腎移植の場合〉 通常、初期にはタクロリムスとして1回 0.15mg/kg を 1 日 2 回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は 1 回 0.06mg/kg、1 日 2 回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。 (他の項 省略:現行のとおり)</p>	<p><b>6. 用法及び用量</b> 〈腎移植の場合〉 通常、移植 2 日前よりタクロリムスとして 1 回 0.15mg/kg を 1 日 2 回経口投与する。術後初期にはタクロリムスとして 1 回 0.15mg/kg を 1 日 2 回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は 1 回 0.06mg/kg、1 日 2 回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。 (他の項 省略)</p>

## 【お問い合わせ先】

あゆみ製薬株式会社 くすり相談室

TEL: 0120-137-413

〈受付時間〉9:00～17:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

以上