

2024 年 8 月

注意事項等情報改訂のお知らせ**武田テバファーマ株式会社**

名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

武田テバ薬品株式会社

大阪府中央区道修町四丁目1番1号

プロトンポンプインヒビター 日本薬局方 ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠 タケプロン®OD 錠 15/30	プロトンポンプインヒビター 日本薬局方 ランソプラゾール腸溶カプセル タケプロン®カプセル 15/30
プロトンポンプインヒビター タケプロン® 静注用 30mg (一般名：ランソプラゾール)	アスピリン/ランソプラゾール配合剤 タケルダ® 配合錠 (一般名：アスピリン/ランソプラゾール)
プロトンポンプインヒビター 日本薬局方 ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠 ランソプラゾール OD 錠 15mg/30mg「武田テバ」	

この度、標記製品の「注意事項等情報」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書（以下、電子添文）をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（抜粋）

（追記箇所 下線：_____）

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
酸化マグネシウム	<略>	<略>	酸化マグネシウム	<略>	<略>
ベルモスジルメシル酸塩	ベルモスジルメシル酸塩の血中濃度が低下する可能性がある。	本剤の胃酸分泌抑制作用による胃内pH上昇によりベルモスジルメシル酸塩の吸収が抑制されるおそれがある。	←追記		
メトトレキサート	<略>	<略>	メトトレキサート	<略>	<略>

注)代表例としてタケプロンOD錠15/30を記載しております。記載内容の詳細については各電子添文をご参照ください。

2. 改訂理由

「相互作用：併用注意」の項に「ベルモスジルメシル酸塩」を追記（自主改訂）

相手薬であるベルモスジルメシル酸塩（レズロック錠、Meiji Seika ファルマ株式会社）電子添文の記載内容と整合性を取り、「相互作用：併用注意」の項にベルモスジルメシル酸塩を追記しました。

- 武田テバDIセンター 0120-923-093 受付時間 9:00～17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)
- 医療関係者向けホームページ <https://www.med.takeda-teva.com>

本改訂につきましては、医薬品安全対策情報（Drug Safety Update）No.329(2024年9月発行)に掲載される予定です。最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）に掲載されます。また、専用アプリ「添文ナビ」より GS1 バーコードを読み取る事で、最新の電子添文等をご参照いただけます。

(タケプロン OD 錠)



(01) 14987123140222

(タケプロンカプセル)



(01) 14987123126332

(タケプロン静注用)



(01) 14987123129456

(タケルダ配合錠)



(01) 14987123154182

(ランソプラゾール OD 錠「武田テバ」)



(01) 14987123415887