

重要な情報が記載されていますので、必ずお読み下さい。

令和 6 年 8 月 - 9 月

金沢市久安 3 丁目 406 番地
辰巳化学株式会社

慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン配合錠
トアラセット[®]配合錠「TCK」

「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和 6 年 8 月付でトアラセット配合錠「TCK」の「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

■ 改訂箇所

~~~~~ 自主改訂による改訂箇所

| 改 訂 後                                 |                                                                                          |                                                                            | 改 訂 前                     |               |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 10. 相互作用<br>現行の通り                     |                                                                                          |                                                                            | 10. 相互作用<br>省略            |               |             |
| 10.1 併用禁忌 (併用しないこと)<br>現行の通り          |                                                                                          |                                                                            | 10.1 併用禁忌 (併用しないこと)<br>省略 |               |             |
| 10.2 併用注意 (併用に注意すること)                 |                                                                                          |                                                                            | 10.2 併用注意 (併用に注意すること)     |               |             |
| 薬剤名等                                  | 臨床症状・<br>措置方法                                                                            | 機序・<br>危険因子                                                                | 薬剤名等                      | 臨床症状・<br>措置方法 | 機序・<br>危険因子 |
| 現行の通り                                 |                                                                                          |                                                                            | 省略                        |               |             |
| リネゾリド                                 | 現行の通り                                                                                    | 現行の通り                                                                      | リネゾリド                     | 省略            | 省略          |
| メチルチオニ<br>ニウム塩化物<br>水和物 (メチ<br>レンブルー) | セロトニン症<br>候群 (錯乱、激<br>越、発熱、発汗、<br>運動失調、反射<br>異常亢進、ミオ<br>クローヌス、下<br>痢等) があらわ<br>れるおそれがある。 | メチルチオニ<br>ニウム塩化物<br>水和物のモノ<br>アミン酸化酵<br>素阻害作用に<br>よりセロトニ<br>ン作用が増強<br>される。 | 省略                        |               |             |
| 現行の通り                                 |                                                                                          |                                                                            |                           |               |             |

なお、他の項は現行の通りとする。

## ■ 改訂理由

CCDS の変更による。

改訂内容につきましては、令和 6 年 9 月発行予定の「医薬品安全対策情報 (DSU) No.329」に掲載されます。  
また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ (<https://www.tatsumi-kagaku.com/>) 及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) に掲載されますので、併せてご利用下さい。  
なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ<sup>®</sup>」を用いて、以下の GS1 バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。



(01)14987124156918