

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2024 年 8 月

製造販売元



日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目 3 番 1 号

慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠

トアラセット®配合錠「日新」

劇薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおりに改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（部：追記）

改訂後		
10. 相互作用 現行のとおり		
10.1 併用禁忌（併用しないこと） 現行のとおり		
10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略)		
リネゾリド	現行のとおり	現行のとおり
<u>メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）</u>	<u>セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクロナス、下痢等）があらわれるおそれがある。</u>	<u>メチルチオニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が増強される。</u>
(略)		

改訂前		
10. 相互作用 省略		
10.1 併用禁忌（併用しないこと） 省略		
10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略)		
リネゾリド	省略	省略
(略)		

改訂理由

◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報(DSU No.329 2024 年 9 月)に掲載される予定です。
最新の電子添文は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) および
弊社 HP (<https://www.yg-nissin.co.jp/>) に掲載致します。
また、電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて以下の GS1 バーコードを読み取ることで電子添文をご覧いただくことが可能です。

トアラセット配合錠「日新」



(01)14987447159016