

使用上の注意改訂のお知らせ

食欲抑制剤

マジンドール錠

劇薬、向精神薬（第三種向精神薬）、習慣性医薬品、処方箋医薬品

サノレックス[®]錠 0.5mg

2024年8月

製造販売元

富士フイルム富山化学株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂しましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂前			改訂後（_____：改訂箇所）		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2. 1～2. 9 （省略） 2. 10 MAO阻害剤投与中又は投与中止後2週間以内の患者 [10. 1参照] 2. 11～2. 12 （省略）			2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2. 1～2. 9 （省略：現行通り） 2. 10 MAO阻害剤（ <u>セレギリン塩酸塩</u> 、 <u>ラサギリンメシル酸塩</u> 及び <u>サフィナミドメシル酸塩</u> ）投与中又は投与中止後2週間以内の患者 [10. 1参照] 2. 11～2. 12 （省略：現行通り）		
10. 相互作用 10. 1 併用禁忌（併用しないこと）			10. 相互作用 10. 1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MAO阻害剤 [2. 10参照]	高血圧クリーゼを起こすことがあるので、MAO阻害剤投与中又はMAO阻害剤投与中止後2週間は、本剤を投与しないこと。	本剤は、交感神経刺激作用を有し、MAO阻害剤の作用を増強すると考えられる。	MAO阻害剤 <u>セレギリン塩酸塩</u> <u>（エフビー）</u> <u>ラサギリンメシル酸塩</u> <u>（アジレクト）</u> <u>サフィナミドメシル酸塩</u> <u>（エクフィナ）</u> [2. 10参照]	高血圧クリーゼを起こすことがあるので、MAO阻害剤投与中又はMAO阻害剤投与中止後2週間は、本剤を投与しないこと。	本剤は、交感神経刺激作用を有し、MAO阻害剤の作用を増強すると考えられる。

- ・ 今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No. 329（2024年9月）に掲載されます。
- ・ PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）に最新の電子添文並びに医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。また、専用アプリ「添文ナビ」で以下のGS1バーコードを読み取ることにより、PMDA ホームページに掲載の電子添文等をご覧いただけます。

サノレックス錠 0.5mg



(01)14987473602548

2. 改訂理由

自主改訂

従来、「2. 禁忌」及び「10.1 併用禁忌」の項に「MAO 阻害剤」を記載し、注意喚起していましたが、MAO 阻害剤の電子添文と整合をとるため、「2. 禁忌」の項に MAO 阻害剤の一般名、「10.1 併用禁忌」の項に MAO 阻害剤の一般名及び販売名を追記しました。

FUJIFILM

製造販売元
富士フイルム 富山化学株式会社

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-14-1 兼松ビル

【問い合わせ先】 製品情報センター

電話番号：0120-502-620

受付時間：9:00～17:00

(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)