

処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤

日本薬局方

カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド錠

カデチア[®] 配合錠 LD・HD「あすか」

処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠

カンデサルタン錠2・4・8・12mg「あすか」

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.329 に掲載される予定です。

2024 年 8 月

あすか製薬株式会社

＜カデチア配合錠 LD・HD「あすか」＞

改訂内容（ ：改訂箇所）

改 訂 後				改 訂 前			
11. 副作用 省略				11. 副作用 省略			
11.1 重大な副作用 省略				11.1 重大な副作用 省略			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
	5%以上	0.1～5%未満	頻度不明		5%以上	0.1～5%未満	頻度不明
省略				省略			
その他		倦怠感、頻尿、 浮腫、咳、血中 CK上昇、CRP 上昇、勃起不 全、視力異常 (霧視等)	鼻出血、脱力感、 腰背部痛、筋肉 痛、筋痙攣、高カ ルシウム血症を伴 う副甲状腺障害、 鼻閉、黄視症、耳 鳴、 <u>関節痛</u>	その他		倦怠感、頻尿、 浮腫、咳、血中 CK上昇、CRP 上昇、勃起不 全、視力異常 (霧視等)	鼻出血、脱力感、 腰背部痛、筋肉 痛、筋痙攣、高カ ルシウム血症を伴 う副甲状腺障害、 鼻閉、黄視症、耳 鳴

(次ページへ続く)

<カンデサルタン錠 2・4・8・12mg「あすか」>

改訂内容(: 改訂箇所)

改 訂 後				改 訂 前			
11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 省略 11.2 その他の副作用 <高血圧症>				11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 省略 11.2 その他の副作用 <高血圧症>			
	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
省略				省略			
その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴、 <u>関節痛</u>	その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴
<慢性心不全> 省略				<慢性心不全> 省略			
	5%以上	0.1～5%未満	<u>頻度不明</u>		5%以上	0.1～5%未満	
省略				省略			
その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	<u>関節痛</u>	その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	

以上

～ 最新の電子添文はこちらから～

カデチア[®] 配合錠 LD・HD「あすか」



(01)04987123512862



カンデサルタン錠 2・4・8・12mg「あすか」



(01)04987123511452

