

2024 年 8 月

注意事項等情報改訂のお知らせ**武田テバファーマ株式会社**

名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

武田テバ薬品株式会社

大阪府中央区道修町四丁目1番1号

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド錠 エカード® 配合錠 LD/HD	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 ブロプレス® 錠 2/4/8/12
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド錠 カデチア® 配合錠 LD/HD「テバ」	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg/12mg「武田テバ」

この度、標記製品の「注意事項等情報」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書（以下、電子添文）をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（抜粋）

エカード配合錠

カデチア配合錠「テバ」

（追記箇所 下線：_____）

改 訂 後				改 訂 前			
11. 副作用 11.2 その他の副作用				11. 副作用 11.2 その他の副作用			
	5%以上	0.1～5%未満	頻度不明		5%以上	0.1～5%未満	頻度不明
その他		倦怠感、頻尿、浮腫、咳、血中CK上昇、CRP上昇、勃起不全、視力異常（霧視等）	鼻出血、脱力感、腰背部痛、筋肉痛、筋痙攣、高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害、鼻閉、黄視症、耳鳴、関節痛	その他		倦怠感、頻尿、浮腫、咳、血中CK上昇、CRP上昇、勃起不全、視力異常（霧視等）	鼻出血、脱力感、腰背部痛、筋肉痛、筋痙攣、高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害、鼻閉、黄視症、耳鳴

ブロプレス錠

カンデサルタン錠「武田テバ」

（追記箇所 下線：_____）

改 訂 後				改 訂 前			
11. 副作用 11.2 その他の副作用 <高血圧症>				11. 副作用 11.2 その他の副作用 <高血圧症>			
	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴、 <u>関節痛</u>	その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴

<裏面につづく>

改訂後				改訂前			
<慢性心不全>				<慢性心不全>			
	5%以上	0.1～5%未満	頻度不明		5%以上	0.1～5%未満	
その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	関節痛	その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	

2. 改訂理由

「副作用：その他の副作用」の項に「関節痛」を追記（自主改訂）

カンデサルタン シレキセチルにおける症例集積を踏まえ、「その他の副作用」の項に「関節痛」を追記しました。

- 武田テバDIセンター 0120-923-093 受付時間 9:00～17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)
- 医療関係者向けホームページ <https://www.med.takeda-teva.com>

本改訂につきましては、医薬品安全対策情報（Drug Safety Update）No.329(2024 年 9 月発行)に掲載される予定です。最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）に掲載されます。また、専用アプリ「添文ナビ」より GS1 バーコードを読み取る事で、最新の電子添文等をご参照いただけます。


(エカード配合錠) (01) 14987123144121


(プロプレス錠) (01) 14987123134887


(カデチア配合錠「テバ」) (01) 14987123412237


(カンデサルタン錠「武田テバ」) (01) 14987123001578