


## 使用上の注意改訂のお知らせ

高リン血症治療剤  
炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠  
**炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」**  
**炭酸ランタンOD錠 500mg「フソー」**

高リン血症治療剤  
炭酸ランタン水和物顆粒剤  
**炭酸ランタン顆粒分包 250mg「フソー」**  
**炭酸ランタン顆粒分包 500mg「フソー」**

この度、標記製品の使用上の注意を改訂しましたので、お知らせ申し上げます。

2024年10月



### 1. 改訂内容 (自主改訂: \_\_\_\_\_部変更)

改訂後					改訂前				
11. 副作用					11. 副作用				
11.2 その他の副作用					11.2 その他の副作用				
	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明		5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
(省略)					(省略)				
その他		A1-P 上昇	胸痛、背部痛、倦怠感、めまい、高カルシウム血症、低リン血症	低カルシウム血症、末梢性浮腫	その他		A1-P 上昇	胸痛、背部痛、倦怠感、めまい、高カルシウム血症、低リン血症	低カルシウム血症
15. その他の注意					15. その他の注意				
15.1 臨床使用に基づく情報					15.1 臨床使用に基づく情報				
胃腸管にランタンの沈着又は薬剤残留物が認められることがある。胃・十二指腸の粘膜におけるランタンの沈着は、内視鏡により様々な大きさ及び形の白っぽい病変として確認されている。また、ランタンが沈着した胃・十二指腸の粘膜では、慢性又は活動性炎症、腺萎縮、再生性変化、小窩過形成、腸上皮化生、新生物など様々な病理学的特徴が確認されたとの報告があるが、ランタンの沈着との関連性は明らかではない。					(←追記) (←追記)				

2. 改訂理由

先発製剤のCCDSの変更に伴い、「副作用」の「その他の副作用」の項および、「その他の注意」の「臨床使用に基づく情報」の項について追記を行いました。

3. 本情報は医薬品安全対策情報(D S U)No. 330 に掲載予定です。

☆添付文書情報は、「医薬品医療機器総合機構ホームページ(URL: <https://www.pmda.go.jp/>)」及び「弊社ホームページ(URL: <https://www.fuso-pharm.co.jp/>)」においてご確認ください。  
スマートフォン等モバイル端末からは、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」をダウンロードし、GS1 バーコードを読み取ることで最新の電子添文を閲覧できます。

炭酸ランタンOD錠「フソー」



炭酸ランタン顆粒分包「フソー」



【本件に関するお問い合わせ先】  
扶桑薬品工業株式会社 安全管理統括部  
TEL 06-6969-1131 FAX 06-6969-3139