



Daiichi-Sankyo

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。——

使用上の注意改訂のお知らせ

長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入粉末剤

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤

イナビル[®]吸入粉末剤20mg

イナビル[®]吸入懸濁用160mgセット

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2024 年10月
第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社 MR に速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

《自主改訂》

「10.2 併用注意（併用に注意すること）」の項に、「経鼻弱毒生インフルエンザワクチン」を記載しました。

2. 改訂内容〔（ ）自主改訂〕

改訂前	改訂後						
(新設)→	10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること） <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>経鼻弱毒生インフルエンザワクチン</td><td>経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が得られないおそれがある。</td><td>ワクチンウイルスの増殖が抑制され、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が減弱する可能性がある。</td></tr></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	経鼻弱毒生インフルエンザワクチン	経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が得られないおそれがある。	ワクチンウイルスの増殖が抑制され、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が減弱する可能性がある。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン	経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が得られないおそれがある。	ワクチンウイルスの増殖が抑制され、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が減弱する可能性がある。					

3. 改訂理由

《自主改訂》

「10.2 併用注意（併用に注意すること）」

抗インフルエンザウイルス剤によりワクチンウイルスの増殖が抑制され、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの効果が減弱する可能性があるため、併用注意に記載しました。

☆本剤の最新の電子添文については、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)及び弊社ホームページ(<https://www.medicalcommunity.jp>)に掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。また、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。

イナビル吸入粉末剤

イナビル吸入懸濁用



(01)14987081103000



(01)14987081109156



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

〈製品情報お問い合わせ先〉

第一三共株式会社 製品情報センター

TEL：0120-189-132

〔受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）〕

INA70S0901

2024年10月作成