

電子添付文書改訂のお知らせ

2024年10月

販売元 大鵬薬品工業株式会社

製造販売元 岡山大鵬薬品株式会社

鎮痛・消炎冷感パップ剤

サリチル酸メチル・*dl*-カンフル・*l*-メントール配合外用剤

MS冷シップ「タイホウ」

鎮痛・消炎温感パップ剤

サリチル酸メチル・*dl*-カンフル・トウガラシエキス配合外用剤

MS温シップ「タイホウ」

経皮鎮痛消炎剤

日本薬局方 フェルビナクパップ

フェルビナクパップ70mg「タイホウ」

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」

このたび、標記製品の電子化された添付文書（以下、電子添文）を以下の通り改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しまして下記をご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験されました際には、弊社医薬情報担当者（MR）に速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

I. 改訂の概要 <医薬安通知による改訂>

1) MS冷シップ「タイホウ」、2) MS温シップ「タイホウ」、3) フェルビナクパップ70mg「タイホウ」

改訂項目	改訂内容
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.5 妊婦	シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降に使用した際の胎児の動脈管収縮の発現リスクについて追記

4) ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg、100mg「タイホウ」

改訂項目	改訂内容
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.5 妊婦	胎児の動脈管収縮に関するリスクの記載について、シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用した際に起きたとの注意喚起に改訂

II. 改訂箇所の対比表(____:改訂箇所、 _____:削除箇所)

1) MS冷シップ「タイホウ」、2) MS温シップ「タイホウ」

改訂後	改訂前
<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 (略)</p> <p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。<u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。(略)</u></p>	<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 (略)</p> <p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。(略)</p>

3) フェルビナクパップ70mg「タイホウ」

改訂後	改訂前
<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 (略)</p> <p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。<u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。(略)</u></p>	<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 (略)</p> <p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。(略)</p>

4) ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg、100mg「タイホウ」

改訂後	改訂前
<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 (略)</p> <p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。<u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。また、シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。(略)</u></p>	<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 (略)</p> <p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。<u>他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。また、シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。(略)</u></p>

Ⅲ. 改訂内容の解説

「9.5 妊婦」〈医薬安通知による改訂〉

シクロオキシゲナーゼ阻害作用を有するNSAIDsについて、妊娠中期の曝露においても胎児動脈管収縮の発現が懸念されたことから、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知が発出され、「9.5 妊婦」の項に、シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降に使用した際の胎児の動脈管収縮の発現リスクについて追記することになりました。

- ・改訂内容は、DSU 医薬品安全対策情報 No.330 (2024年10月) に掲載予定です。
- ・最新の医薬品添付文書情報等は、下記ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。
PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
大鵬薬品工業株式会社「医療関係者向け情報サイト」(<https://www.taiho.co.jp/medical/>)
- ・添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、PMDAホームページ上の最新の電子添文等をご確認いただけます。

GS1 コード

MS冷シップ「タイホウ」	MS温シップ「タイホウ」
 (01)14987117180159	 (01)14987117180258

フェルビナクパップ70mg「タイホウ」
 (01)14987117640707

ロキソプロフェンナトリウム テープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム テープ100mg「タイホウ」
 (01)14987117980100	 (01)14987117980308

【お問い合わせ先】

大鵬薬品工業株式会社 医薬品情報課


〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

TEL 0120-20-4527 (フリーダイヤル) [受付時間：9：00～17：00 (土、日、祝、弊社休業日を除く)]

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年10月



鎮痛・消炎冷感パップ剤

サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール配合外用剤

MS冷シップ®「タイホウ」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社販売製品に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、令和6年10月08日付厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知に基づき、
使用上の注意改訂を下記のとおり行う事となりましたので、詳細をご案内申し上げます。
今後とも、一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 下線部改訂箇所

改訂後	改訂前
<p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。<u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。</u></p>	<p>9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。</p>

上記以外の項目は、最新の電子添文をご確認下さい。

■ 改訂理由

令和6年10月08日付厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知に基づく改訂

今回の改訂情報は、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No. 330(令和6年10月)」に掲載の予定です。

最新の電子添文は、弊社ホームページ(<https://www.mikasaseiyaku.co.jp/>)並びに医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に掲載しております。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」より、以下の GS1 バーコードを読み取ることでもご確認いただけます。あわせてご利用下さい。



以上