

## 使用上の注意改訂のお知らせ

選択的 $\beta_3$ アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

2024年10月

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

ビベグロン錠

**ベオーバ<sup>®</sup>錠50mg**

**杏林製薬株式会社**

東京都千代田区大手町一丁目3番7号

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しまして、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（自主改訂：下線部改訂箇所）

| 改訂後          |         |      |   | 改訂前          |         |      |  |
|--------------|---------|------|---|--------------|---------|------|--|
| 11.2 その他の副作用 |         |      |   | 11.2 その他の副作用 |         |      |  |
|              | 1~2%未満  | 1%未満 | 頻度不明  |              | 1~2%未満  | 1%未満 | 頻度不明   |
| <省略：変更なし>    |         |      |   | <省略>         |         |      |  |
| 消化器          | 口内乾燥、便秘 |      | 悪心、腹部膨満、消化不良、胃炎、胃食道逆流性疾患、下痢、腹痛、 <u>食欲減退</u>         | 消化器          | 口内乾燥、便秘 |      | 悪心、腹部膨満、消化不良、胃炎、胃食道逆流性疾患、下痢、腹痛               |
| <省略：変更なし>    |         |      |   | <省略>         |         |      |  |
| その他          |         |      | 疲労、ほてり、高脂血症、体液貯留、筋肉痛、浮腫、CK上昇、口渇、 <u>血圧上昇</u> 、胸部不快感 | その他          |         |      | 疲労、ほてり、高脂血症、体液貯留、筋肉痛、浮腫、CK上昇、口渇、 <u>血圧上昇</u> |

### 2. 改訂理由

国内において『食欲減退』、『胸部不快感』の副作用報告が集積されたことから、「11.2 その他の副作用」の「消化器」、「その他」の項にそれぞれ追記し、注意喚起することとしました。

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.330」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>



弊社 医療関係者向け医療情報

<https://www.kyorin-pharm.co.jp/prodinfo/>



- 「添文ナビ<sup>®</sup>」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。



<製品についてのお問い合わせ先>  
杏林製薬株式会社 <すり情報センター>  
0120-409341  
(9:00-17:30 土・日・祝日を除く)

## 使用上の注意改訂のお知らせ

選択的 $\beta_3$ アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

2024年10月

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

ビベグロン錠

# ベオーバ<sup>®</sup>錠50mg

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

販売元

 キッセイ薬品工業株式会社  
松本市芳野19番48号

製造販売元

杏林製薬株式会社  
東京都千代田区大手町一丁目3番7号

このたび、標記製品の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しまして、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（自主改訂：下線部改訂箇所）

| 改訂後          |         |      |  | 改訂前          |         |      |                                      |
|--------------|---------|------|--|--------------|---------|------|--------------------------------------|
| 11.2 その他の副作用 |         |      |  | 11.2 その他の副作用 |         |      |                                      |
|              | 1~2%未満  | 1%未満 | 頻度不明                                       |              | 1~2%未満  | 1%未満 | 頻度不明                                 |
| <省略：変更なし>    |         |      |  | <省略>         |         |      |                                      |
| 消化器          | 口内乾燥、便秘 |      | 悪心、腹部膨満、消化不良、胃炎、胃食道逆流性疾患、下痢、腹痛、食欲減退        | 消化器          | 口内乾燥、便秘 |      | 悪心、腹部膨満、消化不良、胃炎、胃食道逆流性疾患、下痢、腹痛       |
| <省略：変更なし>    |         |      |  | <省略>         |         |      |                                      |
| その他          |         |      | 疲労、ほてり、高脂血症、体液貯留、筋肉痛、浮腫、CK上昇、口渇、血圧上昇、胸部不快感 | その他          |         |      | 疲労、ほてり、高脂血症、体液貯留、筋肉痛、浮腫、CK上昇、口渇、血圧上昇 |

### 2. 改訂理由

国内において『食欲減退』、『胸部不快感』の副作用報告が集積されたことから、「11.2 その他の副作用」の「消化器」、「その他」の項にそれぞれ追記し、注意喚起することとしました。

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.330」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>



キッセイ薬品工業株式会社

医療関係者向けホームページ  
<https://med.kissei.co.jp/>



- 「添文ナビ<sup>®</sup>」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。



(01)14987051669123

<お問い合わせ先>

キッセイ薬品工業株式会社 <すり相談センター>  
受付時間：土日祝日、当社休日を除く月～金 9:00～17:40  
フリーダイヤル 0120-007-622