

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年9月

プロスタグランジン₂誘導体制剤
トレプロスチニル
劇薬、処方箋医薬品^注

トレプロスト®注射液 20mg
トレプロスト®注射液 50mg
トレプロスト®注射液 100mg
トレプロスト®注射液 200mg

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

製造販売元 持田製薬株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂しましたのでお知らせ致します。
今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い致します。

■ 改訂内容（改訂箇所のみ抜粋）

部：追記（自主改訂）

改 訂 前				改 訂 後			
11. 副作用 (略)				11. 副作用 (略)			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
	10%以上	10%未満	頻度不明		10%以上	10%未満	頻度不明
(略)				(略)			
筋骨格	四肢痛、顎痛	筋骨格痛		筋骨格	四肢痛、顎痛	筋骨格痛、筋肉痛	
(略)				(略)			

■ 改訂理由

本剤と同一有効成分である「トレプロスト®吸入液1.74mg」の「効能又は効果」、「用法及び用量」に係る承認に伴い、成分共通で発現する可能性が否定できない副作用について、本剤の「11.2 その他の副作用」の項に追記致しました。

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) に最新の電子添文及び医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されます。

最新の電子添文は弊社ホームページ(<https://www.mochida.co.jp/>)にも掲載しております。また、電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」にて、以下のGS1バーコードを読み取っていただくことによりご覧いただけます。

トレプロスト®注射液 (01)14987224090204

