

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

2024年10月

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

ロスバスタチンOD錠2.5mg<sup>明治</sup>

ロスバスタチンOD錠5mg<sup>明治</sup>

販売元 Meファルマ株式会社  
東京都中央区京橋2-4-16

製造販売元 Meiji Seika ファルマ株式会社  
東京都中央区京橋2-4-16

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しますのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、最新の「電子化された添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

### I. 改訂内容（該当部分のみ）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること) (該当部分のみ)			10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること) (該当部分のみ)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
チカグレ ロル	本剤の血漿中濃度上昇により横紋筋融解症やミオパチーのリスクが増加するおそれがある。	チカグレロルがBCRPを阻害することにより本剤の排出が阻害され、本剤の血漿中濃度が上昇する可能性がある <sup>1,2)</sup> 。	(該当記載なし)		
23. 主要文献 1) Lehtisalo M, et al.: Br J Clin Pharmacol. 2023;89(7):2309-15 2) Lehtisalo M, et al.: Clin Pharmacol Ther. 2024;115(1):71-9			23. 主要文献 (該当記載なし)		

\_\_\_\_\_ : 自主改訂による改訂箇所

### II. 改訂理由 自主改訂

先発医薬品の電子化された添付文書における自主改訂に基づき改訂しました。

#### －お願い－

弊社医薬品にて副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、下記問い合わせ先までご連絡の上、調査へのご協力をお願い申し上げます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室 (Meファルマ株式会社専用ダイヤル)  
フリーダイヤル(0120)261-158 FAX(03)3272-2438

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に、最新の電子化された添付文書が掲載されます。また、以下のGS1コードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることも最新の電子化された添付文書等をご参照いただけます。



(01)14987916000962  
ロスバスタチンOD錠

GVRO202407M