

## 「使用上の注意改訂」のご案内

持続性がん疼痛治療剤

2024年11月

# MS ツワイスロン<sup>®</sup>カプセル10mg MS ツワイスロン<sup>®</sup>カプセル30mg MS ツワイスロン<sup>®</sup>カプセル60mg

製造販売元 帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松 567 番地

平素より格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、標記製品につきまして、使用上の注意を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（部：改訂箇所）

改訂後			現行		
10. 相互作用 (略)			10. 相互作用 (略)		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略)			(略)		
クロピドグレル硫酸塩 チカグレロル プラスグレル塩酸塩	左記の薬剤の血漿中濃度を低下させる可能性がある。	本剤の消化管運動抑制作用に関連すると考えられる。	(該当記載なし)		

- 改訂後の電子添文につきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページ（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）にてご確認ください。
- 今回の改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.331（2024年12月）に掲載されます。

### 2. 改訂理由

先発医薬品の使用上の注意改訂情報に基づき、10.2併用注意に「クロピドグレル硫酸塩」、「チカグレロル」および「プラスグレル塩酸塩」を追記しました。

タブレットやスマートフォンの専用アプリ「添文ナビ」を用いてGS1コードを読み取り、PMDA ホームページにアクセスすることで電子添文をご参照いただけます。

「添文ナビ」のインストール方法及びGS1コードの読み取り方法につきましては、日本製薬団体連合会のホームページ（<http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/index.htm>）をご参照ください。

MS ツワイスロンカプセル



(01)14987641077284

### 《製品に関するお問い合わせ先》

帝國製薬株式会社 医薬営業部 製品情報室  
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 6 番 6 号  
TEL : 0120-189-567  
受付時間 月～金 9:00～17:30（祝日および当社休日を除く）