sawai

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年12月
沢井製薬株式会社

アミノグリコシド系抗生物質製剤
処方箋医薬品
日本薬局方　アミカシン硫酸塩注射液
アミカシン硫酸塩注射液 100mg「SW」
アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1．改訂内容（下線部改訂又は追加箇所、取り消し線部削除箇所）

改　訂　後

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ループ利尿剤 フロセミド アゾセミド トラセミド　等	腎障害及び聴器障害が発現、悪化するおそれがあるので、併用は避けることが望ましい。	機序は明確でないが、併用によりアミノグリコシド系抗生物質の血中濃度の上昇、腎への蓄積が起こるという報告がある。
麻酔剤 筋弛緩剤 ロクロニウム臭化物 A型ボツリヌス毒素製剤　等 コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	呼吸抑制があらわれるおそれがある。呼吸抑制があらわれた場合には必要に応じ、コリンエステラーゼ阻害剤、カルシウム製剤の投与等の適切な処置を行うこと。	両薬剤ともに神経筋遮断作用を有しており、併用によりその作用が増強される。

改　訂　前

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ループ利尿剤 フロセミド アゾセミド　等	腎障害及び聴器障害が発現、悪化するおそれがあるので、併用は避けることが望ましい。	機序は明確でないが、併用によりアミノグリコシド系抗生物質の血中濃度の上昇、腎への蓄積が起こるという報告がある。
麻酔剤 筋弛緩剤 ~~ベクロニウム臭化物~~ A型ボツリヌス毒素製剤　等	呼吸抑制があらわれるおそれがある。呼吸抑制があらわれた場合には必要に応じ、コリンエステラーゼ阻害剤、カルシウム製剤の投与等の適切な処置を行うこと。	両薬剤ともに神経筋遮断作用を有しており、併用によりその作用が増強される。

2．改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。また、販売が中止されている薬剤を削除致しました。

GS1

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ（https://www.pmda.go.jp）および弊社の医療関係者向け総合情報サイト（https://med.sawai.co.jp）に掲載しております。

アミカシン硫酸塩注射液100mg/200mg「SW」

(01)14987080275517

沢井製薬株式会社　大阪市淀川区宮原５丁目 2-30
TEL：0120-381-999