

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ——

使用上の注意改訂のお知らせ

2024 年 12 月－2025 年 1 月

経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

フェンタニル経皮吸収型製剤

劇薬、麻薬、処方箋医薬品^{注)}

フェンタニル3日用テープ 2.1mg「HMT」
フェンタニル3日用テープ 4.2mg「HMT」
フェンタニル3日用テープ 8.4mg「HMT」
フェンタニル3日用テープ 12.6mg「HMT」
フェンタニル3日用テープ 16.8mg「HMT」
FENTANYL 3-DAYS Tapes

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

このたび、標記製品の**使用上の注意**を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

〔 〃 〕：下線部追記箇所、.....：破線部改訂箇所

改 訂 後				現 行			
11. 副作用 (略)				11. 副作用 (略)			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
	1%以上	1%未満	頻度不明		1%以上	1%未満	頻度不明
(略)				(略)			
精神神経系	傾眠、めまい	不眠、不穏、せん妄、 いらいら感、不安、うつ病、 幻覚、健忘、錯乱、頭痛、 味覚異常、振戦、激越、 多幸症、記憶障害、 回転性めまい	錯感覚、感覚鈍麻、 無感情、注意力障害、 錐体外路障害、 痛覚過敏 ^{注)} 、アロプレニア	精神神経系	傾眠、めまい	不眠、不穏、せん妄、 いらいら感、不安、うつ病、 幻覚、健忘、錯乱、頭痛、 味覚異常、振戦、激越、 多幸症、記憶障害、 回転性めまい	錯感覚、感覚鈍麻、 無感情、注意力障害、 錐体外路障害
(略)				(略)			
消化器	嘔気、便秘、嘔吐	下痢、腹痛、イレウス、 口渇、口内炎	胃部不快感、消化不良、 痔核、食道運動障害	消化器	嘔気、便秘、嘔吐	下痢、腹痛、イレウス、 口渇、口内炎	胃部不快感、消化不良、 痔核
(略)				(略)			
※発現頻度は使用成績調査を含む				注) 発現頻度は使用成績調査を含む			
注) 増量により痛みが増悪する。							

【改訂理由】

先発医薬品の「11. 副作用」が改訂されたため、本剤の「11. 副作用」の「11.2 その他の副作用」を改訂いたしました。

【お問い合わせ先】

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
TEL. 0120-381332 FAX. (03)5293-1723
受付時間／9:00－17:50（土日・祝日・会社休日を除く）

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」に改訂後の電子化された添付文書及び医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されますので、ご参照ください。また、以下のバーコードを「添文ナビ」で読み取ることで、電子化された添付文書及び関連文書を閲覧いただけます。

フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」



フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」

