

2025 年 4 月

医療関係者各位

製造販売元：エイワイファーマ株式会社
販売元：株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

蛋白分解酵素阻害剤

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。
ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後			改訂前
10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）			新設
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
乾燥濃縮人活性化プロテインC 乾燥濃縮人プロテインC	活性化プロテインCの作用を減弱させるおそれがある。	本剤は活性化プロテインCの活性を低下させる。	
トロンボモデュリン アルファ （遺伝子組換え）	本剤の作用が増強するおそれがある。本剤との併用の安全性は明らかになっておらず、併用に際しては慎重に投与の判断を行うこと。	併用により、抗凝固作用が相加的に作用する。	

〈改訂理由〉

相互作用相手薬の電子添文との整合性を図るため、「10.相互作用」の項に「10.2 併用注意（併用に注意すること）」を新設し、「乾燥濃縮人活性化プロテインC」、「乾燥濃縮人プロテインC」及び「トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）」を追記しました。

- DSU No.335（2025 年 4 月発行）掲載予定
- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。
陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト（<https://www.yoshindo.co.jp/>）
医薬品医療機器総合機構のホームページ（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）
- 専用アプリ「添文ナビ」を用いてGS1 バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

ナファモスタットメシル酸塩注射用
10 mg /50 mg /100 mg /150 mg 「AY」



お問い合わせは、担当 MR 又は弊社医薬営業部門までご連絡ください。
株式会社陽進堂 医薬営業部門 フリーダイヤル 0120-647-734

以上