

2025 年 4-5 月

日 医 工 株 式 会 社  
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

蛋白分解酵素阻害剤

劇薬、処方箋医薬品<sup>注)</sup>

ナファモスタットメシル酸塩製剤

注射用フサン<sup>®</sup>10

注射用フサン<sup>®</sup>50

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

蛋白分解酵素阻害剤

劇薬、処方箋医薬品<sup>注)</sup>

注射用ナファモスタットメシル酸塩

ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「NIG」

ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「NIG」

ナファモスタットメシル酸塩注射用 100mg 「NIG」

製造販売元 日医工岐阜工場株式会社

発売元 日 医 工 株 式 会 社

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ ..... : 自主改訂）

| 改訂後                           |                                                              |                        | 改訂前 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 10. 相互作用                      |                                                              |                        | ←新設 |
| 10.2 併用注意（併用に注意すること）          |                                                              |                        |     |
| 薬剤名等                          | 臨床症状・措置方法                                                    | 機序・危険因子                |     |
| 乾燥濃縮人活性化プロテインC<br>乾燥濃縮人プロテインC | 活性化プロテインCの作用を減弱させるおそれがある。                                    | 本剤は活性化プロテインCの活性を低下させる。 |     |
| トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）         | 本剤の作用が増強するおそれがある。本剤との併用の安全性は明らかになっておらず、併用に際しては慎重に投与の判断を行うこと。 | 併用により、抗凝固作用が相加的に作用する。  |     |

### <改訂理由>

- ・相互作用相手薬の添付文書との整合を図るため、**10.2 併用注意**を新設し、「乾燥濃縮人活性化プロテイン C」、「乾燥濃縮人プロテイン C」及び「トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）」を記載しました。

### <GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ<sup>てんぶん</sup>®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ<sup>てんぶん</sup>®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

注射用フサン



ナファモスタットメシル酸塩注射用「NIG」



今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.335」(2025 年 4 月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。