

使用上の注意改訂のお知らせ

プロトンポンプ阻害剤

2025 年 3 月

ラベプラゾールナトリウム錠

ラベプラゾールNa錠5mg「杏林」

ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」

ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」

RABEPRAZOLE Na Tablets

RABEPRAZOLE Na Tablets

製造販売元

キョーリンメディオ株式会社

富山県南砺市井波885番地

このたび、弊社製造販売のラベプラゾール Na 錠 5mg「杏林」／ラベプラゾール Na 錠 10mg「杏林」及びラベプラゾール Na 錠 20mg「杏林」の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部 削除箇所）

改 訂 後			改 訂 前		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.2 リルピビリン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]			2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.2 アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リルピビリン塩酸塩（エジュラント） [2.2 参照]	リルピビリン塩酸塩の作用を減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、リルピビリン塩酸塩の吸収が低下し、リルピビリンの血中濃度が低下することがある。	アタザナビル硫酸塩（レイアタツ） [2.2 参照]	アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。
			リルピビリン塩酸塩（エジュラント） [2.2 参照]	リルピビリン塩酸塩の作用を減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、リルピビリン塩酸塩の吸収が低下し、リルピビリンの血中濃度が低下することがある。

2. 改訂理由

相互作用相手薬の製造販売中止に伴い、「禁忌」及び「併用禁忌」の項の「アタザナビル硫酸塩」に関する記載を削除いたしました。

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>



弊社 医療関係者向け Web サイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>



- 「添文ナビ®」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。

ラベプラゾール Na 錠 5mg・10mg 「杏林」



(01)14987060309454

ラベプラゾール Na 錠 20mg 「杏林」



(01)14987060303803



医療関係者向けWebサイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>

本件に関する
お問い合わせ

キョーリン リメディオ株式会社 学術部

TEL 0120-960189

FAX 0120-189099