

使用上の注意改訂のお知らせ

2025 年 3 月

製造販売元



日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目 3 番 1 号

プロトンポンプ阻害剤
ラベプラゾールナトリウム錠
ラベプラゾールNa錠5mg「日新」
ラベプラゾールNa錠10mg「日新」
ラベプラゾールNa錠20mg「日新」

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおりに改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（取消線部：削除）

改 訂 後			改 訂 前																	
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.2 リルピビリン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]			2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.2 アタザナビル硫酸塩、 リルピビリン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]																	
10. 相互作用 現行のとおり 10.1 併用禁忌（併用しないこと） <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>リルピビリン塩酸塩 (エジュラント) [2.2 参照]</td><td>現行のとおり</td><td>現行のとおり</td></tr></table>			薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	リルピビリン塩酸塩 (エジュラント) [2.2 参照]	現行のとおり	現行のとおり	10. 相互作用 省略 10.1 併用禁忌（併用しないこと） <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>アタザナビル硫酸塩 (レイアタッツ) [2.2 参照]</td><td>アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。</td><td>本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。</td></tr><tr><td>リルピビリン塩酸塩 (エジュラント) [2.2 参照]</td><td>省略</td><td>省略</td></tr></table>			薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	アタザナビル硫酸塩 (レイアタッツ) [2.2 参照]	アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。	リルピビリン塩酸塩 (エジュラント) [2.2 参照]	省略	省略
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																		
リルピビリン塩酸塩 (エジュラント) [2.2 参照]	現行のとおり	現行のとおり																		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																		
アタザナビル硫酸塩 (レイアタッツ) [2.2 参照]	アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。																		
リルピビリン塩酸塩 (エジュラント) [2.2 参照]	省略	省略																		

改訂理由

◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報(DSU No.335 2025 年 4 月)に掲載される予定です。
最新の電子添文は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) および
弊社 HP (<https://www.yg-nissin.co.jp/>) に掲載致します。
また、電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて以下の GS1 バーコードを読み取ることで電子添文をご覧いただくことが可能です。

ラベプラゾール Na 錠 5mg・10mg「日新」



(01)14987447599010

ラベプラゾール Na 錠 20mg「日新」



(01)14987447558017