

金沢市久安3丁目406番地
辰巳化学株式会社

プロトンポンプ阻害剤
ラベプラゾールナトリウム錠
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「TCK」
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」

プロトンポンプ阻害剤
ラベプラゾールナトリウム錠
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」

「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年3月付で、ラベプラゾールナトリウム錠 5mg 「TCK」、同錠 10mg 「TCK」 及び同錠 20mg 「TCK」 の「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

■ 改訂箇所

~~~~~ 自主改訂による変更箇所

| 改 訂 後                                                                                                                                               | 改 訂 前                                                                                  |                                                                  |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）<br/>2.1 現行の通り<br/>2.2 リルピビリン塩酸塩を投与中の患者〔10.1 参照〕</div>                                                                     | <div>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）<br/>2.1 省略<br/>2.2 アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩を投与中の患者〔10.1 参照〕</div> |                                                                  |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |
| 10. 相互作用<br>現行の通り<br>10.1 併用禁忌（併用しないこと）                                                                                                             | 10. 相互作用<br>省略<br>10.1 併用禁忌（併用しないこと）                                                   |                                                                  |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |
| <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>リルピビリン塩酸塩（エジュラント）<br/>〔2.2 参照〕</td><td>現行の通り</td><td>現行の通り</td></tr></table> | 薬剤名等                                                                                   | 臨床症状・措置方法                                                        | 機序・危険因子 | リルピビリン塩酸塩（エジュラント）<br>〔2.2 参照〕 | 現行の通り | 現行の通り | <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>アタザナビル硫酸塩（レイアタツ）<br/>〔2.2 参照〕</td><td>アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。</td><td>本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。</td></tr></table> | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | アタザナビル硫酸塩（レイアタツ）<br>〔2.2 参照〕 | アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。 | 本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。 |
| 薬剤名等                                                                                                                                                | 臨床症状・措置方法                                                                              | 機序・危険因子                                                          |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |
| リルピビリン塩酸塩（エジュラント）<br>〔2.2 参照〕                                                                                                                       | 現行の通り                                                                                  | 現行の通り                                                            |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |
| 薬剤名等                                                                                                                                                | 臨床症状・措置方法                                                                              | 機序・危険因子                                                          |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |
| アタザナビル硫酸塩（レイアタツ）<br>〔2.2 参照〕                                                                                                                        | アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。                                                                  | 本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内 pH が上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。 |         |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                               |      |           |         |                              |                       |                                                                  |

| 改 訂 後                         | 改 訂 前                                 |           |         |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 10.2 併用注意（併用に注意すること）<br>現行の通り | 薬剤名等                                  | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|                               | リルピビリン塩<br>酸塩（エジュラ<br>ント）<br>[2.2 参照] | 省略        | 省略      |
|                               | 10.2 併用注意（併用に注意すること）<br>省略            |           |         |

なお、他の項は現行の通りとする。

■ 改訂理由

相互作用相手薬の製造販売中止（経過措置期間満了）のため。

改訂内容につきましては、令和 7 年 4 月発行予定の「医薬品安全対策情報 (DSU) No.335」に掲載されます。  
また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ (<https://www.tatsumi-kagaku.com/>) 及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) に掲載されますので、併せてご利用下さい。  
なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ<sup>®</sup>」を用いて、以下の GS1 バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。

ラベプラゾールナトリウム錠 5mg・10mg 「TCK」：  
(01)14987124134817

ラベプラゾールナトリウム錠 20mg 「TCK」：  
(01)14987124134916