

2025 年 5-6 月

日 医 工 株 式 会 社
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

「使用上の注意」改訂のお知らせ

合成ペニシリン製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 アモキシシリンカプセル

アモキシシリンカプセル125mg 「日医工」

アモキシシリンカプセル250mg 「日医工」

製造販売元 日医工ファーマ株式会社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ : 自主改訂）

改訂後				改訂前			
10. 相互作用				10. 相互作用			
10.2 併用注意（併用に注意すること）				10.2 併用注意（併用に注意すること）			
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子		薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
省略（変更なし）				省略			
プロベネシド	省略（変更なし）			プロベネシド	省略		
メトトレキサート	メトトレキサートの副作用を増強させるおそれがある。	メトトレキサートの尿細管分泌を阻害し、尿中排泄を低下させると考えられている。		←追記			
11. 副作用				11. 副作用			
省略（変更なし）				省略			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
〈ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症〉				〈ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症〉			
	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
省略（変更なし）				省略			
消化器	省略（変更なし）			消化器	省略		
皮膚			線状IgA水疱症	←追記			
省略（変更なし）				省略			
〈ヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎〉				〈ヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎〉			
省略（変更なし）				省略			

<改訂理由>

- ・海外症例において、同一成分薬とメトトレキサートとの相互作用を示唆する知見が得られていることから、**10.2 併用注意**に「メトトレキサート」を追記しました。
- ・同一成分薬における症例の集積に基づき、**11.2 その他の副作用**に「皮膚」の項目を新設し、「線状 IgA 水疱症」を追記しました。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

アモキシシリンカプセル「日医工」



今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.336」(2025 年 6 月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。