

処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤

日本薬局方

カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド錠

カデチア<sup>®</sup> 配合錠 LD・HD「あすか」

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知により、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.336に掲載される予定です。

2025年5月

あすか製薬株式会社

改訂内容（      ：改訂箇所、      ：削除箇所）

改訂後	改訂前
<p>8. 重要な基本的注意</p> <p>8.1～8.6 省略</p> <p>8.7 <u>ヒドロクロロチアジドは急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出を発現させるおそれがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には、直ちに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。[11.1.18参照]</u></p>	<p>8. 重要な基本的注意</p> <p>8.1～8.6 省略</p> <p>← 新規</p>
<p>11. 副作用</p> <p>省略</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1～11.1.17 省略</p> <p>11.1.18 <u>急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出</u>（いずれも頻度不明） 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障、<u>脈絡膜滲出</u>があらわれることがある。<u>[8.7参照]</u></p>	<p>11. 副作用</p> <p>省略</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1～11.1.17 省略</p> <p>11.1.18 急性近視、閉塞隅角緑内障（頻度不明） 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障があらわれることがあるので、<u>急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。</u></p>

以上

～ 最新の電子添文はこちらから～

カデチア<sup>®</sup> 配合錠 LD・HD「あすか」



(01)04987123512862

