

使用上の注意改訂のお知らせ

バルヒディオ配合錠 MD「ツルハラ」 バルヒディオ配合錠 EX「ツルハラ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

◆改訂内容（下線は変更箇所）

改訂後	現行
8. 重要な基本的注意 8.1~8.3（略） 8.4 <u>ヒドロクロロチアジドは急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出を発現させるおそれがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には、直ちに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。</u> [11.1.18 参照] 8.5~8.9（以下、項目番号繰り下げ）	8. 重要な基本的注意 8.1~8.3（略） （新設） 8.4 ~8.8（略）
11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1、11.1.2（略） 11.1.3 肝炎（頻度不明） [8.5 参照] 11.1.4~11.1.17（略） 11.1.18 <u>急性近視、閉塞隅角緑内障、脈絡膜滲出</u> （いずれも頻度不明） 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障、 <u>脈絡膜滲出</u> があらわれることがある。 [8.4 参照]	11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1、11.1.2（略） 11.1.3 肝炎（頻度不明） [8.4 参照] 11.1.4~11.1.17（略） 11.1.18 急性近視、閉塞隅角緑内障（いずれも頻度不明） 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障があらわれることがある <u>ので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。</u>

◆改訂理由

＜通知による改訂＞令和7年5月20日付 厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知に基づく改訂

【電子化された添付文書（電子添文）の閲覧について】

製品の外箱等に記載されたGS1バーコードを専用のアプリケーション（添文ナビ）で読み取ることで、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページより本製品の最新の電子化された添付文書をご覧頂けます。

また、電子化された添付文書については、弊社ホームページ（<http://www.tsuruhara-seiyaku.co.jp/medical/>）からも閲覧、印刷頂けます。

紙媒体の添付文書をご希望される場合は、お手数をお掛け致しますが、弊社MR又は弊社問合せ先までご連絡ください。

専用のアプリケーション（添文ナビ）で下記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



【弊社問合せ先】 鶴原製薬株式会社 医薬情報部 TEL：0120-901-758 受付時間 9：00～17：15（土・日、祝祭日、弊社休業日を除く）