

「使用上の注意」改訂のお知らせ

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 注射用アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

ピシリバクタ静注用 0.75g

ピシリバクタ静注用 1.5g

ピシリバクタ静注用 3g

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

富山市総曲輪1丁目6番21

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

＜改訂内容＞（ ：自主改訂）

改訂後					改訂前				
11. 副作用					11. 副作用				
省略（変更なし）					省略				
11.1 省略（変更なし）					11.1 省略				
11.2 その他の副作用					11.2 その他の副作用				
	1% 以上	0.1～1% 未満	0.1% 未満	頻度不明		1% 以上	0.1～1% 未満	0.1% 未満	頻度不明
省略（変更なし）					省略				
血液	好酸球増多	白血球減少			血液	好酸球増多	白血球減少		
代謝及び 栄養障害				低カリウム 血症	←追記				
省略（変更なし）					省略				

＜改訂理由＞

- ・ 同一成分薬における「使用上の注意」の改訂に基づき、11.2 その他の副作用に「代謝及び栄養障害」の項目を新設し、「低カリウム血症」を追記しました。

＜GS1 バーコード＞

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

ピシリバクタ静注用



(01)14987376251713

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.339」(2025 年 9 月発行)に掲載の予定です。
また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>)
ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。