

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2025年8月

製造販売元

太陽ファルマ株式会社

高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛 治療剤
日本薬局方 プロプラノロール塩酸塩錠
劇薬、処方箋医薬品^{注)}

インデラル[®]錠10mg
INDERAL[®] Tablets

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

ベータ遮断性 不整脈・狭心症 治療剤
プロプラノロール塩酸塩注射液
劇薬、処方箋医薬品^{注)}

インデラル[®]注射液2mg
INDERAL[®] for Injection

このたび標記製品の「使用上の注意」を改訂しましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては本内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

❖改訂の概要

インデラル錠 10mg／インデラル注射液 2mg

「10. 相互作用」の項より製造販売中止した相互作用相手薬を削除しました。
(自主改訂)

❖改訂内容

インデラル錠 10mg／インデラル注射液 2mg

改訂後			改訂前 (下線部：削除)		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤 β遮断剤 (チモロール等の点眼剤を含む) 等	(略)	(略)	交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤 <u>レセルピン</u> 、β遮断剤 (チモロール等の点眼剤を含む) 等	(略)	(略)
血糖降下剤 インスリン、アセトヘキサミド等	(略)	(略)	血糖降下剤 インスリン、 <u>トルブタミド</u> 、アセトヘキサミド等	(略)	(略)
クラスⅠ抗不整脈剤 ジソピラミド、プロカインアミド等 クラスⅢ抗不整脈剤 アミオダロン等	(略)	(略)	クラスⅠ抗不整脈剤 ジソピラミド、プロカインアミド、 <u>アジマリン</u> 等 クラスⅢ抗不整脈剤 アミオダロン等	(略)	(略)

❖改訂理由

1. 自主改訂

本剤の併用注意相手薬として設定していた「アジマリン、トルブタミド、レセルピン」は製造販売中止されていることから記載を削除しました。

❖その他：インデラル錠 10mg の刻印／識別コード変更

インデラル錠 10mg の刻印／識別コードを変更します。

変更前「ZNC219：10」 ⇄ 変更後「TYP219：10」

当面の間、新旧製品が混在することとなりますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

変更後		変更前	
3.2 製剤の性状		3.2 製剤の性状	
剤形	割線のある白色・円形の素錠	剤形	割線のある白色・円形の素錠
外形 表面		外形 表面	
外形 裏面		外形 裏面	
外形 側面		外形 側面	
直径	約6.5mm	直径	約6.5mm
厚さ	2.3～2.7mm	厚さ	2.3～2.7mm
質量	約0.11g	質量	約0.11g
識別コード	TYP219：10	識別コード	ZNC219：10

❖お問い合わせ

太陽ファルマ株式会社 お客様相談室
東京都千代田区丸の内1-6-5
受付時間 9:00-17:30（土・日・祝・弊社休日を除く）
電話：0120-533-030
<https://www.taiyo-pharma.co.jp>

「使用上の注意」改訂の内容は医薬品安全対策情報（DSU）（No. 339 2025年9月発行予定）に掲載予定です。

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」（<https://www.pmda.go.jp/>）に電子化された添付文書及び医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて、以下のGS1コードを読み取ることで医薬品医療機器総合機構ホームページ上の最新の添付文書等をご覧いただけます。

インデラル錠 10mg



(01)14987925670101

インデラル注射液 2mg



(01)14987925605103