

処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤
日本薬局方
カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド錠

カデチア[®]配合錠LD・HD「あすか」

劇薬、処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
持続性Ca拮抗薬配合剤
日本薬局方

カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩錠

カムシア[®]配合錠LD・HD「あすか」

処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤
日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠

カンデサルタン錠2・4・8・12mg「あすか」

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知により、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.339に掲載される予定です。

2025年9月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ：改訂箇所）

改訂後	改訂前
11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 11.1.1 血管性浮腫（頻度不明） 顔面、口唇、舌、咽・喉頭等の腫脹を症状とする血管性浮腫があらわれることがある。 <u>また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管血管性浮腫があらわれることがある。</u> 11.1.2 ～ 省略	11. 副作用 省略 11.1 重大な副作用 11.1.1 血管浮腫（頻度不明） 顔面、口唇、舌、咽・喉頭等の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがある。 11.1.2 ～ 省略

以上

～ 最新の電子添文はこちらから～

カデチア[®]配合錠LD・HD「あすか」


(01)04987123512862



カムシア[®]配合錠LD・HD「あすか」


(01)04987123512602



カンデサルタン錠2・4・8・12mg「あすか」


(01)04987123511452

